

## هپارین با وزن مولکولی کم

مددجوی گرامی داروی تجویز شده برای شما clexan از دسته داروهایی است که از تشکیل لخته در عروق جلوگیری می کند که به صورت آمپولهای ۲۰۰۰ / ۴۰۰۰ / ۶۰۰۰ / ۸۰۰۰ در بازار موجود می باشد. این دارو جهت جلوگیری از ایجاد لخته در عروق ریه ( آمبولی ریه ) و جلوگیری از ایجاد لخته های وریدهای عمیق ( DVT ) بعد از جراحی های ارتوپدی مثلاً بعد از تعویض مفصل زانو و حتی جراحی های شکمی به صورت تزریق زیر جلدی ، استفاده می شود .

## تداخلات

از مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای ضد انعقاد خودداری کنید زیرا سبب افزایش خطر خون ریزی می شود .

## توصیه

این دارو را در ۲۵ درجه سانتی گراد نگه دارید و آن را منجمد نسازید .

## مددجوی گرامی :

- جهت پیشگیری از خونریزی لته از مسواک دندانانه نرم استفاده نموده و ریش تراش برقی به کار نبرید .  
- هر گونه علامت خونریزی از لته ها ، خونریزی زیر پوستی ، خون در ادرار و خون در مدفوع را گزارش دهید .  
- از مصرف همزمان با داروهای آسپرین خودداری کنید مگر آنکه طبق دستور پزشک تجویز شده باشد .

- با استفاده از کیسه یخ می توان کبودی محل تزریق را بر طرف ساخت .

- از مصرف خودسرانه دارو بدون تجویز پزشک جداً خودداری فرمایید .

## هپارین

مددجوی گرامی داروی تجویز شده برای شما دارویی است که جهت جلوگیری از تشکیل لخته در عروق بکار می رود . این دارو به صورت آمپولهای ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ u / ml در بازار موجود است . دوز تجویز شده هپارین در هر فرد با توجه به وضعیت بیمار ، سن ، وزن ، وضعیت کبدی یا کلیوی او متفاوت است .

از مصرف همزمان هپارین با داروهای دیگر مثل پنی سیلین ، سفالوسپورین ها ، clexan، آسپرین و وارفارین خودداری شود . زیرا احتمال خونریزی را زیاد می کند .





بیمارستان فرمانیه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

## هیپارین و کلکزان



تاریخ تدوین : بهار ۹۰

تاریخ بازنگری : ۱۴۰۰

تاریخ بازنگری بعدی : ۱۴۰۳

Code : FH-Pam:9-24

## نکات مهم :

- این دارو را در ظرف درب بسته نگهدارید .
- از مصرف این دارو با داروهای دیگر مثل آسپرین و ... اجتناب ورزید . مگر اینکه با نظر پزشک باشد .
- این دارو ممکن است طی دوره خونریزی فعال ( پیروود ) بسته به شرایط قطع شود .
- به منظور پیشگیری از خونریزی لثه ها از مسواک نرم استفاده نمایید .
- از ورزش های تهاجمی اجتناب ورزیده از تیغ و تزریق عضلانی استفاده نکنید .
- علائم و خونریزی را گزارش کنید : خونریزی از لثه ، خونریزی زیر پوستی ، خون در ادرار و مدفوع (
- انجام آزمایشات PTT — PT , INR طی دوره درمان با این دارو توصیه می شود .