

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) از پر کاربردترین داروهای پزشکی هستند. کاهش التهاب، ضد درد و تب از خواص مهم این داروها می باشد. این گروه از داروها در دوزهای بالا اثرات ضد التهابی دارند، و از این جهت منحصر به فرد هستند که غیر مخدر می باشند و اعتیادی ایجاد نمی کنند. ناپروکسن و ایبوپروفن از جمله این داروها محسوب می شوند.

ناپروکسن

این دارو به اشکال ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرمی در بازار موجود می باشد. این دارو به آسانی از مجرای گوارشی جذب می شود.

موارد احتیاط:

این دارو در موارد زخم گوارشی، بیماری قلبی و بیماری کلیوی باید با احتیاط و با نظر پزشک مصرف شود.

عوارض جانبی دارو:

هر دارویی در کنار اثرات مثبت دارای عوارضی است که ممکن است موقت و گذرا باشد. از جمله عوارض این دارو وجود خون در ادرار، سرگیجه، سردرد، تهوع و یبوست و تپش قلب است.



به نکات زیر توجه فرمایید:

در صورت تاری دید، وزوز گوش، تغییر در الگوی دفع ادرار، افزایش میزان وزن، ورم (بخصوص در صورت و اندام تحتانی)، افزایش درد مفاصل، تب، وجود خون در ادرار، مدفوع سیاه قیری و نشانه های آنفلوآنزا حتماً با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

از مصرف آسپرین و الکل اجتناب ورزید.

ایبوپروفن

این دارو داروی ضد التهاب و ضد درد خوبی است اما در موارد اختلال انعقاد خونی، سابقه بیماری های گوارشی، کبدی یا کلیوی، پولیپ بینی و آسم منع مصرف دارد.

در صورت تاری دید، صدای زنگ در گوش، تغییر در الگوی دفع ادرار، افزایش میزان وزن و افزایش درد مفاصل، تب و خون در ادرار حتماً با پزشک معالج خود تماس بگیرید.



بیمارستان فرمانیه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی



تاریخ تدوین : بهار ۹۰

تاریخ بازنگری : ۱۴۰۰

تاریخ بازنگری بعدی : ۱۴۰۳

Code : FH-Pam:9-14

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما

- ♦ از مصرف این دارو با الکل و سایر داروهای این دسته مثل آسپرین خودداری فرمایید .
- ♦ به منظور پیشگیری از حساسیت به نور آفتاب از ضد آفتاب استفاده نمایید .

نکته مهم :

داروهای (NSAID) باعث پوکی استخوان نمی شوند و هیچ مطالعه ای که نمایانگر اثر نامطلوب بر استخوان و پدید آمدن پوکی استخوان باشد موجود نیست .